

# SONIN



EVOLABIS SIF

Atualizado em 09/12/2014

## Composição de Sonin

cada 5 ml contém: maleato de pimetixeno 0,5 mg.Veículo q.s.p. 5 ml.

## Posologia e Administração de Sonin

conforme prescrição médica. Como sugestão, recomenda-se o seguinte esquema posológico: crianças até 1 ano: 1/4 a 1/2 copo-medida, 3 vezes ao dia (2,5 a 5 ml). Crianças de 1 a 3 anos: 1/2 a 3/4 copo-medida, 3 vezes ao dia (5 a 7,5 ml). Crianças de 3 a 9 anos: 3/4 a 1 copo-medida, 3 vezes ao dia (7,5 a 10 ml). Crianças acima de 9 anos: 1 a 1 1/2 copo-medida, 3 vezes ao dia (10 a 15 ml). Nota: 1/2 copo-medida (5 ml) corresponde a 1 colher de chá. Nos casos de insônia ou quando o sono for interrompido por crises de tosse ou prurido, pode-se administrar uma quarta dose à noite ou ao deitar. - Superdosagem: o tratamento da superdosagem com o pimetixeno é o mesmo aplicado aos casos de intoxicação por anti-histamínicos.

## Indicações de Sonin

como calmante pediátrico no tratamento dos estados de agitação ou dos distúrbios do sono decorrentes de etiologias diversas, especialmente conseqüentes a: doenças infecciosas em geral; doenças acompanhadas de tosse e expectoração como as bronquites em geral e asma; doenças alérgicas da pele; doenças alérgicas das vias respiratórias e dos olhos, tais como: rinites, sinusites, rinossinusites e conjuntivites. Antes de exames radiológicos ou laboratoriais traumatizantes. No pré e pós-operatório. Tratamento dos estados de nervosismo da criança, como adjuvante. Tratamento de estados de agitação ou nervosismo em pessoas idosas com dificuldade de deglutição e que apresentem contra-indicações ao uso de tranqüilizantes maiores.

## Apresentação de Sonin

frasco com 120 ml.

